

九、草莓葉部薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%亞滅培水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.25-0.3 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.採果期避免施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥，設施栽培採收前12天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥，設施栽培採收前12天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥，設施栽培採收前12天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥，設施栽培採收前12天停止施藥。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	限開花前使用。
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	限開花前使用。

*延伸使用藥劑