

六、蓮霧粉介殼蟲類

桔粉介殼蟲

學名：*Planococcus citri* (Risso)

英名：Citrus mealybug

俗名：白龜神

危害作物：柑桔、鳳梨、番石榴、香蕉、桑、棉、時計果、落花生等40種。

生活習性：

本蟲一年發生6~7世代，蟲體體表被有臘粉，移動性弱，終年均可見，世代重疊，於乾旱季節發生多。成蟲老熟時自尾端分泌棉絮狀之白臘質卵囊，產卵於囊內。成蟲、若蟲皆密集於枝葉、葉腋、果實（果蒂部）或潛伏於鬆脫之皮層下刺吸汁液，分泌蜜露，誘發煤病，阻礙葉片之光合作用及降低果實品質。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
75%陶斯松 水分散性粒劑* (Chlorpyrifos)	0.3-1.0 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-1.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.5-1.5 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

*延伸使用藥劑