

十、蓮霧葉蟎類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.3%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.3-1.0 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
10%芬殺蟎乳劑* (Fenazaquin)	0.6-2.0 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
15%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.4-1.2 公升	2,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
30%賜派芬水懸劑* (Spirodiclofen)	0.4-1.2 公升	2,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
20%賽芬蟎水懸劑* (Cyflumetofen)	0.5-1.5 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
39.5%扶吉胺水懸劑* (Fluazinam)	0.5-2.0 公升	1,500	害蟎發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
1%密滅汀乳劑* (Milbemectin)	1.0-2.0 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
10%得芬瑞可濕性粉劑* (Tebufenpyrad)	0.5-1.5 公斤	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
10%芬普寧水懸劑* (Fenpropathrin)	1-3公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

*延伸使用藥劑