

鼠李科梨果類

一、鼠李科梨果類輪斑病

學名：*Cristulariella pyramidalis* Waterman and Marshall

英名：Ring spot

病徵：

秋冬季葉上產生輪紋狀褐色大型病斑。低溫時病斑兩面著生白色至淡黃褐色、錘形、桑椹狀或聖誕樹狀之分生孢子體。被害葉易脫落。落葉上產生2~3公厘不整形暗色之菌核。

傳播途徑：藉分生孢子傳播。

防治方法：

1. 棗樹開花後，經常巡視果園，如發現少數病葉時，應即輕輕摘取置入紙袋或塑膠袋中，就地燒燬。
2. 果園及附近雜草，應注意清除。
3. 在不影響果實發育情況下，減少病區灌水。
4. 果實採收後之落葉殘枝，應集中燒燬。
5. 藥劑防治：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%免賴得 可濕性粉劑 (Benomyl)	0.3-0.6 公斤	1,500- 3,000	連續陰雨時，每週施藥一次，連續數次，直到病害完全抑制為止。	1. 施藥時加用展著劑「出來通X-114」或「出來通B1956」3,000倍。 2. 應噴佈葉片上下兩面。 3. 採收前6天停止施藥。