

## 八、鼠李科梨果類薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
11.7%賜諾特水懸劑* (Spinetoram)	0.3-0.4 公升	3,200	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
5.87%賜諾特水懸劑* (Spinetoram)	0.5-0.8 公升	1,600	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
20%亞滅培水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.2-0.6 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%丁基加保扶可濕性粉劑* (Carbosulfan)	0.4-1.67 公斤	1,200	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
48.34%丁基加保扶乳劑* (Carbosulfan)	0.4-1.67 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
48.34%丁基加保扶水基乳劑* (Carbosulfan)	0.4-1.67 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
16%可尼丁水溶性粒劑* (Clothianidin)	0.2-0.83 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	0.5-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天後施藥一次。	採收前15天停止施藥。
20%亞滅培水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.15-0.63 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具呼吸中等毒性。
10%亞滅寧乳劑* (Alphacypermethrin)	0.15-0.63 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對眼具中度刺激性，對蜜蜂毒性強；對水生生物劇毒，禁用於水域、空中施藥及大面積施用。
10%亞滅寧水懸劑* (Alphacypermethrin)	0.15-0.63 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
3%亞滅寧水基乳劑* (Alphacypermethrin)	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
3%亞滅寧乳劑* (Alphacypermethrin)	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對眼具中度刺激性。
28.8%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.1-0.42 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具口服、呼吸中等毒性，對眼具中度刺激性；對蜜蜂毒性高。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.3-1.25 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高；水生物中等毒。
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.3-1.25 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高；水生物中等毒。
2.8%第滅寧水基乳劑* (Deltamethrin)	0.4-1.67 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧乳劑* (Deltamethrin)	0.4-1.67 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.4%第滅寧水懸劑* (Deltamethrin)	0.4-1.67 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-1.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具口服及呼吸中等毒性，中度眼刺激性。 3.對蜜蜂具劇毒性。
40.8%陶斯松水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-1.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具口服中等毒性。
20%達特南水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.2-0.83 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具呼吸中等毒；對蜜蜂劇毒。
100g/L賜派滅水懸劑* (Spirotetramat)	0.5-0.8 公升	1,500	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-cyhalothrin)	0.3-1.25 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-cyhalothrin)	0.3-1.25 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-cyhalothrin)	0.3-1.25 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-cyhalothrin)	0.3-1.25 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

\*延伸使用藥劑

TACTRI