

十、鼠李科梨果類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.5-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	1-1.5公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.5-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.5-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda- cyhalothrin)	0.2-0.3 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda- cyhalothrin)	1.1-1.7 公斤	700	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.5-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前28天停止施藥。
22.5%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
25%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.8-1.2 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.7 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.7 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.4-0.6 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
19.7%得芬諾 水懸劑* (Tebufenozide)	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天再施藥一次。	採收前21天停止施藥。
70%得芬諾 可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.3-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天再施藥一次。	採收前21天停止施藥。
11.7%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生初期開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda- Cyhalothrin)	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑