

十三、鼠李科梨果類葉蟎類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
240g/L賜滅芬水懸劑* (Spiromesifen)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
50%芬佈賜可溼性粉劑* (Fenbutatin-oxide)	0.6-1.7 公升	1,500	害蟎發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
50%芬佈賜水懸劑* (Fenbutatin-oxide)	0.6-1.7 公升	1,500	害蟎發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
18.3%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.3-0.4 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
10%芬殺蟎乳劑* (Fenazaquin)	0.5-0.8 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
15%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.3-0.5 公升	2,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟎發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
39.5%扶吉胺水懸劑* (Fluazinam)	0.5-2.0 公升	1,500	害蟎發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
20%賽芬蟎水懸劑* (Cyflumetofen)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

*延伸使用藥劑

