

# 稻作病蟲害

## 水稻病害

### 一、稻種消毒

為消滅附著在稻種上的稻熱病、苗徒長病、胡麻葉枯病、條葉枯病、小粒菌核病等病原菌，以減輕在苗床和本田發病機會。稻種經選種後，任選下表一種藥劑消毒。

藥劑名稱	浸藥時間 (小時)	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
25.9%得克利 水基乳劑 (Tebuconazole)		2,000	稻種直接消毒24小時後， 再浸水催芽。	
50%免賴得 可濕性粉劑 (Benomyl)	4 12	1,000	稻種預先浸水催芽，至萌芽時， 即刻浸漬於左列藥液內，並時加攪動 (或搖動)，以提高藥效。	1. 稻種消毒後不必水洗即可播種。 2. 藥液調配後24小時內， 可以連續使用三次。
40%免賴地 可濕性粉劑 (Benomyl + Thiram)	4 12	1,000	稻種預先浸水催芽，至萌芽時， 即刻浸漬於左列藥液內，並時加攪動 (或搖動)，以提高藥效。	1. 稻種消毒後不必水洗即可播種。 2. 藥液調配後24小時內， 可以連續使用三次。
80%多得淨 可濕性粉劑 (Thiophanate + Thiram)	6 12	800	稻種預先浸水催芽，至萌芽時， 以左列藥劑浸漬，並時加攪拌， 以提高藥效。	稻種消毒後不必水洗， 陰乾後即可播種。
30%佈生乳劑 (TCMTB)	6	1,000	1. 稻種浸漬時加攪拌， 以提高藥效。 2. 消毒後再浸水催芽。	藥液可連續使用二次。
30%佈生乳劑 (TCMTB)		60倍(每 100公斤稻 種用藥量 110公撮)	1. 將塑膠布鋪在平坦地上， 然後將稻種均勻鋪其上， 隨即將稀釋液均勻撒佈， 予以充分攪拌。 2. 消毒後放置2天以上再 浸水催芽。	
25%撲克拉 水基乳劑 (Prochloraz)	24	1,000	稻種直接消毒24小時後， 再浸水催芽。	
25%撲克拉乳劑 (Prochloraz)	24	1,000	稻種直接消毒24小時後， 再浸水催芽。	
41.8%腐絕水懸劑 (Thiabendazole)	1 6	2,000	稻種預先浸水催芽，然後 以藥劑浸漬。	1. 消毒後即可播種。 2. 藥液可以連續使用二 次。
41.8%腐絕水懸劑 (Thiabendazole)	24	2,000	稻種直接消毒後再浸水催 芽。	

藥劑名稱	浸藥時間 (小時)	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
40%腐絕 可濕性粉劑 (Thiabendazole)	1 6	2,000	稻種預先浸水催芽，然後 以藥劑浸漬。	1.消毒後即可播種。 2.藥液可以連續使用二 次。
40%腐絕 可濕性粉劑 (Thiabendazole)	24	1,500	稻種直接消毒後再浸水催 芽。	

TACTRI