

# 水稻蟲害

## 一、水稻稻蟲類、葉蟬類、椿象類、薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%芬殺松乳劑 (Fenthion)	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	1.收穫前21天停止施藥。 2.本藥劑僅防治薊馬類。
50%芬殺松 水基乳劑 (Fenthion)	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	1.收穫前21天停止施藥。 2.本藥劑僅防治薊馬類。
25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.3公斤	1,600	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.本藥劑僅防治葉蟬類。
30%治滅蟲乳劑* (Metolcarb)	1.2-1.5 公升	800	分藥期每隔7天施藥一次。	
50%治滅蟲 可濕性粉劑* (Metolcarb)	0.5-0.6 公斤	2,000	分藥期每隔7天施藥一次。	
85%加保利 可濕性粉劑* (Carbaryl)	0.5-0.7 公斤	1,700		收割前21天停止施藥。
3%加保扶粒劑* (Carbofuran)	40-60 公斤			
5%丁基加保扶 粒劑* (Carbosulfan)	40公斤			收割前29天停止施藥。
37%繁米松溶液* (Vamidotion)	1.2-1.5 公升			
40%免敵克 可濕性粉劑* (Bendiocarb)	1-1.2公斤	1,000		收割前15天停止施藥。
20%免扶克乳劑* (Benfuracarb)	2.0-2.4 公升	500	分藥期每隔7至10天施藥一次。	收割前37天停止施藥。
25%免扶克 可濕性粉劑* (Benfuracarb)	1.4-1.7 公斤	700	分藥期每隔7至10天施藥一次。	1.收割前37天停止施藥。 2.水稻生長期，如發現每叢水稻褐飛蟲平均密度在5隻以上，開始施藥，隔7-10天再施藥1次。 3.在褐飛蟲若蟲期施藥，效果較佳。 4.避免於開花期使用。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%免扶克水懸劑* (Benfuracarb)	1.0-1.2 公升	1,000	分藥期每隔7至10天施藥一次。	1.收割前37天停止施藥。 2.水稻生長期，如發現每叢水稻褐飛蝨平均密度在5隻以上，開始施藥，隔7-10天再施藥1次。 3.在褐飛蝨若蟲期施藥，效果較佳。 4.避免於開花期使用。

\*延伸使用藥劑

TACTRI