

二、水稻飛蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.3公斤	1,600	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
15%布得芬諾 可濕性粉劑* (Buprofezin + Tebufenozide)	1.2公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	收割前15天停止施藥。
16%可尼丁 水溶性粒劑* (Clothianidin)	0.4公斤	3,000	田間褐飛蟲密度每樣平均5隻左右施藥一次，其後如密度升高至每樣20隻以上時，行第二次施藥。	採收前10天停止施藥。
0.5%可尼丁粒劑* (Clothianidin)	育苗箱： 每公頃施用50公克		育苗箱使用：插秧前24小時，將藥劑均勻撒布於育苗箱，並灑水至飽和狀態。	
0.5%可尼丁粒劑* (Clothianidin)	本田：每公頃每次施40-60公斤		本田使用：1.害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次。2.有施藥時稻田需保持水位約1公分。	

*延伸使用藥劑