

六、甘 藷 基 腐 病

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
5%菲克利水懸劑* (Hexaconazole)	5.3公升	750	栽培初期於植株地基部澆灌一次，間隔7天施用一次，共三次。	採收前9天停止施藥。
10%菲克利水懸劑* (Hexaconazole)	2.7公升	1,500	栽培初期於植株地基部澆灌一次，間隔7天施用一次，共三次。	採收前9天停止施藥。
10%菲克利乳劑* (Hexaconazole)	2.7公升	1,500	栽培初期於植株地基部澆灌一次，間隔7天施用一次，共三次。	採收前9天停止施藥。
23%菲克利水懸劑* (Hexaconazole)	1.1公升	3,500	栽培初期於植株地基部澆灌一次，間隔7天施用一次，共三次。	採收前9天停止施藥。
40%腐絕 可濕性粉劑* (Thiabendazole)	4公斤	1,000	栽培初期於植株地基部澆灌一次，間隔7天施用一次，共三次。	採收前9天停止施藥。
41.8%腐絕水懸劑* (Thiabendazole)	4公升	1,000	栽培初期於植株地基部澆灌一次，間隔7天施用一次，共三次。	採收前9天停止施藥。

*延伸使用藥劑