

十、旋花科根菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
10%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.1-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.1-0.3 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.1-0.8 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.1-0.8 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.1-0.8 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.2-1.2 公斤	1,000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑