

二十三、甘 藷 葉 蟎 類

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
2%阿巴汀乳劑* (Abamectin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2%阿巴汀 水基乳劑* (Abamectin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

*延伸使用藥劑