

# 風茹病蟲害

## 一、風茹炭疽病

防治方法：任選下表一種藥劑防治

| 藥劑名稱   | 每公頃每次施藥量       | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法                   | 注意事項        |
|--|----------------|---------|------------------------|-------------|
| 27.3%三氟得克利水懸劑*<br>(Trifloxystrobin + Tebuconazole) | 0.1-0.4<br>公升  | 2,500   | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前21天停止施藥。 |
| 23.6%百克敏乳劑*<br>(Pyraclostrobin)                    | 0.08-0.5<br>公升 | 3,000   | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。   | 採收前21天停止施藥。 |
| 75%四氯異苯腈可濕性粉劑*<br>(Chlorothalonil)                 | 0.4-1.7<br>公斤  | 600     | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。   | 採收前14天停止施藥。 |
| 75%四氯異苯腈水分散性粒劑*<br>(Chlorothalonil)                | 0.4-1.7<br>公斤  | 600     | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。   | 採收前14天停止施藥。 |
| 40%四氯異苯腈水懸劑*<br>(Chlorothalonil)                   | 0.8-3.1<br>公升  | 320     | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。   | 採收前14天停止施藥。 |
| 24.9%待克利乳劑*<br>(Difenoconazole)                    | 0.08-0.3<br>公升 | 3,000   | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。   | 採收前21天停止施藥。 |
| 24.9%待克利水懸劑*<br>(Difenoconazole)                   | 0.08-0.3<br>公升 | 3,000   | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。   | 採收前21天停止施藥。 |
| 250g/L待克利乳劑*<br>(Difenoconazole)                   | 0.08-0.3<br>公升 | 3,000   | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。   | 採收前21天停止施藥。 |
| 10%待克利水分散性粒劑*<br>(Difenoconazole)                  | 0.2-0.8<br>公斤  | 1,200   | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。   | 採收前21天停止施藥。 |

\*延伸使用藥劑