

葫蘆科瓜類

瓜菜類：包括胡瓜、小黃瓜、苦瓜、絲瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、隼人瓜、越瓜及夏南瓜等。
 瓜果類：包括西瓜、香瓜、洋香瓜等。

一、葫蘆科作物露菌病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
34%鹼氯氫氧銅水懸劑* (Copper oxychloride + Copper hydroxide)	2.25公升	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，最多施藥四次。	
560g/L四氯托敏水懸劑* (Chlorothalonil + Azoxystrobin)	0.8-2公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	<ol style="list-style-type: none"> 1.洋香瓜、香瓜、西瓜採收前14天(設施栽培20天)停止施藥。 2.葉用葫蘆科蔬菜採收前10天(設施栽培16天)停止施藥。 3.其他瓜類採收前7天(設施栽培13天)停止施藥。
35%達滅克絕可濕性粉劑* (Dimethomorph + Cymoxanil)	0.5-1.3公斤	1,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	<ol style="list-style-type: none"> 1.洋香瓜、香瓜、西瓜、波斯瓜採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。 2.苦瓜、絲瓜、扁蒲、冬瓜、南瓜、夏南瓜、隼人瓜、越瓜採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。 3.葉用葫蘆科蔬菜採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。

*延伸使用藥劑