

四、茄科作物白粉病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
44.2%克收欣水懸劑* (Kresoxim-methyl)	0.2-0.6公升	2,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類、果菜類採收前7天停止施藥。 2.根菜類採收前14天停止施藥。
50%克收欣水分散性粒劑* (Kresoxim-methyl)	0.2-0.5公斤	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類、果菜類採收前7天停止施藥。 2.根菜類採收前14天停止施藥。
40%邁克尼可濕性粉劑* (Myclobutanil)	0.04-0.1公斤	12,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類、果菜類採收前7天停止施藥。 2.根莖菜類採收前14天停止施藥。 3.提高濃度可能引起幼苗發生藥害。
13.4%邁克尼乳劑* (Myclobutanil)	0.1-0.4公升	4,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類、果菜類採收前7天停止施藥。 2.根莖菜類採收前14天停止施藥。 3.提高濃度可能引起幼苗發生藥害。
13.4%邁克尼水基乳劑* (Myclobutanil)	0.1-0.4公升	4,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類、果菜類採收前7天停止施藥。 2.根莖菜類採收前14天停止施藥。 3.提高濃度可能引起幼苗發生藥害。

*延伸使用藥劑