

## 五、茄科作物灰黴病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
37.4%派美尼水懸劑* (Pyrimethanil)	0.3-1 公升	1,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前7天停止施藥。 2.果菜類採收前3天停止施藥。 3.根莖菜類採收前21天停止施藥。 4.高溫高熱下施用，可能引起藥斑發生。
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑* (Cyprodinil + Fludioxonil)	0.3-0.8 公斤	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前14天停止施藥。 2.果菜類採收前7天停止施藥。 3.根莖菜類採收前21天停止施藥。
23.7%依普同水懸劑* (Iprodione)	0.5-1.5 公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類、果菜類採收前6天停止施藥。 2.根菜類採收前15天停止施藥。
50%依普同可濕性粉劑* (Iprodione)	0.3-0.8 公斤	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類、果菜類採收前6天停止施藥。 2.根菜類採收前15天停止施藥。

\*延伸使用藥劑