

## 二十二、番 茄 幼 苗 疫 病

學名：*Phytophthora capsici* Leonian

英名：Phytophthora blight

病徵：

本病在高溫多濕下易發生，被害幼苗呈腰折狀。多濕時上面著生白色黴狀物，為本菌之游走子囊。被害苗極易死亡，被害未死苗移植後生育受阻；一般田間植株不受害。本病菌寄主範圍極廣。

傳播途徑：藉游走子囊釋放之游走子傳播。

防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每平方公尺每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
35%依得利可濕性粉劑 (Etridiazole)	1.3公克	3,000	1.播種前1~2天灌藥，若發病時每10天灌藥一次。 2.以澆水器均勻淋灌於苗床土壤。	1.濃度提高會發生藥害。 2.需有防雨設備。 3.本病僅為害幼苗，高溫多雨時易發生。 4.限苗期使用。
25%依得利乳劑 (Etridiazole)	2.7公撮	1,500	1.播種前1~2天灌藥，若發病時每10天灌藥一次。 2.以澆水器均勻淋灌於苗床土壤。	1.濃度提高會發生藥害。 2.需有防雨設備。 3.本病僅為害幼苗，高溫多雨時易發生。 4.限苗期使用。

TAG