

## 七、十字花科蔬菜白銹病

| 藥劑名稱                                     | 每公頃每次施藥量       | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法                   | 注意事項  |
|--|----------------|---------|------------------------|---|
| 75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑*<br>(Mancozeb + Zoxamide) | 0.2-0.8<br>公斤  | 1,200   | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.小葉菜類採收前9天、包葉菜類採收前21天、根莖菜類採收前12天停止施藥。<br>2.避免與礦物油、石灰硫黃混合使用。<br>3.避免於開花期或高溫多濕下使用。 |
| 50%達滅芬可濕性粉劑*<br>(Dimethomorph)           | 0.08-0.3<br>公斤 | 3,000   | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 小葉菜類採收前6天、包葉菜類採收前12天、根菜類採收前7天停止施藥。  |
| 50%達滅芬水懸劑*<br>(Dimethomorph)             | 0.08-0.3<br>公升 | 3,000   | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 小葉菜類採收前6天、包葉菜類採收前12天、根菜類採收前7天停止施藥。  |
| 500g/L達滅芬水懸劑*<br>(Dimethomorph)          | 0.08-0.3<br>公升 | 3,000   | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 小葉菜類採收前6天、包葉菜類採收前12天、根菜類採收前7天停止施藥。  |

\*延伸使用藥劑