

一百零七、茄科小葉菜類疫病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	1.25-3.75 公升	400	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.25-0.75 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
2.5%右滅達樂 粒劑* (Metalaxyl-M)	20公斤		種植前於畦面均勻施藥。	限種植前使用。
35%滅達樂 可濕性粉劑* (Metalaxyl)	3公克		3公克藥劑加水10毫升，藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。	限拌種前施用。
35%滅達樂 水懸劑* (Metalaxyl)	3公克		3公克藥劑加水10毫升，藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。	限拌種前施用。
17.5%滅達樂 溶液* (Metalaxyl)	5毫升		每公斤種子使用5毫升，將種子放入塑膠袋內，徐徐倒入藥液均勻混拌。	限拌種前施用。
35%滅達樂種子處理水分散性粒劑* (Metalaxyl)	3公克		3公克藥劑加水10毫升，藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。	限拌種前施用。

*延伸使用藥劑