

二十二、菊科作物露菌病

(包括不結球、半結球及結球萵苣、茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、昭和草、艾草、牛蒡、黑婆羅門蔘等作物)

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%達滅芬可濕性粉劑* (Dimethomorph)	0.08-0.3 公斤	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前6天、包葉菜類採收前12天、根菜類採收前7天停止施藥。
50%達滅芬水懸劑* (Dimethomorph)	0.08-0.3 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前6天、包葉菜類採收前12天、根菜類採收前7天停止施藥。
500g/L達滅芬水懸劑* (Dimethomorph)	0.08-0.3 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前6天、包葉菜類採收前12天、根菜類採收前7天停止施藥。
60.8%氟比拔克水懸劑* (Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride)	0.2-0.7 公升	1,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類及包葉菜類採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。 2.根莖菜類採收前21天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.1-0.5 公升	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前9天(設施栽培15天)、包葉菜類採收前15天，取食根部者採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑