

三十二、菊科小葉菜類疫病

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.75-2.5 公升	400	病害發生初期開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.15-0.5 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.5%右滅達樂 粒劑* (Metalaxyl-M)	20公斤		種植前於畦面均勻施藥。	限種植前使用。
35%滅達樂 可濕性粉劑* (Metalaxyl)	3公克		3公克藥劑加水10毫升， 藥劑配成漿狀，與種子拌 勻後播種。	限拌種前施用。
35%滅達樂 水懸劑* (Metalaxyl)	3公克		3公克藥劑加水10毫升， 藥劑配成漿狀，與種子拌 勻後播種。	限拌種前施用。
17.5%滅達樂 溶液* (Metalaxyl)	5毫升		每公斤種子使用5毫升， 將種子放入塑膠袋內，徐 徐倒入藥液均勻混拌。	限拌種前施用。
35%滅達樂種子處 理水分散性粒劑* (Metalaxyl)	3公克		3公克藥劑加水10毫升， 藥劑配成漿狀，與種子拌 勻後播種。	限拌種前施用。

*延伸使用藥劑