

四十七、結球萵苣露菌病

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	1.25公升	800	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，連續三次。	採收前15天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，連續三次。	採收前15天停止施藥。
250g/L亞托敏 水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，連續三次。	採收前15天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.05-0.25 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
75%鋅錳座賽胺 水分散性粒劑* (Mancozeb + Zoxamide)	0.2-0.8 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.避免與礦物油、石灰硫黃混合使用。 3.避免於開花期或高溫多濕下使用。

*延伸使用藥劑

TAC