

六十、蔥科小葉菜類白絹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
15%福多寧乳劑* (Flutolanil)	0.9-2.2 公升	900	發病初期於植株莖基部澆灌，必要時隔10天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
20%福多寧水懸劑* (Flutolanil)	0.7-1.7 公升	1,200	發病初期於植株莖基部澆灌，必要時隔10天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
50%福多寧 可濕性粉劑* (Flutolanil)	0.3-0.7 公斤	3,000	發病初期於植株莖基部澆灌，必要時隔10天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
50%撲滅寧 水懸劑* (Procymidone)	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥，每隔10天再施藥一次。	採收前14天停止施藥。
50%撲滅寧 可濕性粉劑* (Procymidone)	0.5公斤	2,000	病害發生初期開始施藥，每隔10天再施藥一次。	採收前14天停止施藥。
15%福多寧乳劑* (Flutolanil)	1.0-1.3 公升	900	發病初期開始施藥於植株莖基部，以後每隔10天施藥一次，連續三次。	小葉菜類之安全採收期為18天。
20%福多寧水懸劑* (Flutolanil)	0.8-1.0 公升	1,200	發病初期開始施藥於植株莖基部，以後每隔10天施藥一次，連續三次。	小葉菜類之安全採收期為18天。
50%福多寧 可濕性粉劑* (Flutolanil)	0.3-0.4 公斤	3,000	發病初期施藥一次，7天後再施藥一次。	小葉菜類之安全採收期為18天。

*延伸使用藥劑