

六十二、蔥科小葉菜類疫病

| 藥劑名稱 | 每公頃每 次施藥量 | 稀釋倍數 (倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 10%亞托敏水懸劑 (Azoxystrobin) | 2-5公升 | 400 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 |
| 50%亞托敏 水分散性粒劑 (Azoxystrobin) | 0.4-1 公斤 | 2,000 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 |
| 2.5%右滅達樂粒劑* (Metalaxyl-M) | 20公斤 | | 種植前於畦面均勻施藥。 | 限種植前使用。 |
| 35%滅達樂 可濕性粉劑* (Metalaxyl) | 3公克 | | 3公克藥劑加水10毫升，藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。 | 限拌種前施用。 |
| 35%滅達樂水懸劑* (Metalaxyl) | 3公克 | | 3公克藥劑加水10毫升，藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。 | 限拌種前施用。 |
| 17.5%滅達樂溶液* (Metalaxyl) | 5毫升 | | 每公斤種子使用5毫升，將種子放入塑膠袋內，徐徐倒入藥液均勻混拌。 | 限拌種前施用。 |
| 35%滅達樂種子處 理水分散性粒劑* (Metalaxyl) | 3公克 | | 3公克藥劑加水10毫升，藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。 | 限拌種前施用。 |

*延伸使用藥劑