

六十四、青蔥銹病

學名：*Puccinia allii* (DC.) Rudolphi

英名：Rust

病徵：本病為害葉片及花梗，表皮稍有突起後破裂，露出橘紅色粉狀物，是為本菌夏孢子。
傳播途徑：

以夏孢子傳播，地力較差處易發生猖獗為害。多在早春至4~5月間為害，當氣溫轉高，雨水豐沛時即不見。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
28%亞托環克座水懸劑 (Cyproconazole + Azoxystrobin)	0.3-0.4公升	3,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續四次。	採收前10天停止施藥。
50%三氟敏水分散性粒劑 (Trifloxystrobin)	0.3-0.5公斤	4,000	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。	1.採收前12天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
23%三泰隆水分散性乳劑 (Triadimenol)	0.6-1.0公升	2,000	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑出來通CS-7 3,000倍。 2.採收前15天停止施藥。
23%三泰隆乳劑 (Triadimenol)	0.6-1.0公升	2,000	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑出來通CS-7 3,000倍。 2.採收前15天停止施藥。