

## 六十八、韭 銹 病

學名：*Puccinia allii* (DC.) Rudolphi

英名：Rust

病徵：本病為害葉片及花梗，表皮稍有突起後縱裂，露出黃色粉狀物，是為本菌夏孢子堆。

傳播途徑：以夏孢子堆傳播。一般氣溫涼爽爰時發病較多，冬季可看到黑色冬孢子堆。

防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
23.6%百克敏乳劑 (Pyraclostrobin)	0.4-0.5 公升	2,500	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續三次。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.採收前15天停止施藥。</li> <li>2.限使用於韭菜，不得使用於韭黃及韭菜花。</li> <li>3.具中等口服急毒性，呼吸急毒性，中度眼刺激性及皮膚刺激性。</li> <li>4.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。</li> </ol>
5%菲克利水懸劑 (Hexaconazole)	0.6-0.8 公升	1,500	發病初期開始施藥，以後每隔7至10天施藥一次。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.採收前9天停止施藥。</li> <li>2.限使用於韭菜，不得使用於韭黃及韭菜花。</li> </ol>