

十二、蔥科根菜類紫斑病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	1-1.25 公升	1,200	病害發生初期開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.4-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
250g/L亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.4-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
50%亞托敏水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.2-0.25 公斤	6,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑* (Polyoxins)	0.8-2 公斤	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	
50%保粒黴素(甲)水溶性粒劑* (Polyoxins)	0.2-0.4 公斤	5,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	
50%(POLYOXIN-B 500,000AmBu/g)保粒黴素(甲)水溶性粒劑* (Polyoxins)	0.2-0.4 公斤	5,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	
44.2%克收欣水懸劑* (Kresoxim-methyl)	0.3-0.8 公升	2,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
50%克收欣水分散性粒劑* (Kresoxim-methyl)	0.3-0.7 公斤	2,800	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
45%甲鋅保粒素可濕性粉劑* (Propineb + Polyoxins)	1.6-4 公斤	500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
75%四氯異苯腈可濕性粉劑* (Chlorothalonil)	1.8-2.1 公斤	700	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
75%四氯異苯腈水分散性粒劑* (Chlorothalonil)	1.8-2.1 公斤	700	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
40%四氯異苯腈水懸劑* (Chlorothalonil)	2.5-6.3 公升	320	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

*延伸使用藥劑

