

### 十三、蔥科根菜類銹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
43.7%三氟敏水懸劑* (Trifloxystrobin)	0.2-0.6 公升	3,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.抽苔後不得使用。
500g/L三氟敏(50%w/v)水懸劑* (Trifloxystrobin)	0.2-0.5 公升	4,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.抽苔後不得使用。
10%菲克利乳劑* (Hexaconazole)	0.3-0.7 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7-10天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.不得用於韭黃、韭菜花及蒜苔。
10%菲克利水懸劑* (Hexaconazole)	0.3-0.7 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7-10天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.不得用於韭黃、韭菜花及蒜苔。
23%菲克利水懸劑* (Hexaconazole)	0.1-0.3 公升	6,900	病害發生初期開始施藥，必要時隔7-10天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.不得用於韭黃、韭菜花及蒜苔。
5%菲克利水懸劑* (Hexaconazole)	0.5-1.3 公升	1,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7-10天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.不得用於韭黃、韭菜花及蒜苔。
28%亞托環克座水懸劑* (Cyproconazole + Azoxystrobin)	0.3-0.7 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

\*延伸使用藥劑