

十四、蔥科根菜類露菌病

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	1.25公升	800	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5公升	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
250g/L亞托敏 水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5公升	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.25公斤	4,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
71.6%銅右滅達樂 可濕性粉劑* (Copper Oxychloride + Metalaxyl-M)	1.3-3.3 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
76.5%銅滅達樂 可濕性粉劑* (Copper Oxychloride + Metalaxyl)	1.3-3.3 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
80%錳乃浦 可濕性粉劑* (Maneb)	2-5 公斤	400	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
37%錳乃浦水懸劑* (Maneb)	4-10 公斤	200	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑