

十七、洋蔥紫斑病（黑斑病）

學名：*Alternaria porri* (Ellis) Ciferri

英名：Purple blotch

病徵：

被害葉初呈現小型褐斑，漸擴大成紡錘形褐色病斑，邊緣為紅色或紫色。上下兩邊稍黃化。
 傳播途徑：高溫多濕時病斑上著生褐色至黑色分生孢子，以資傳播。本病亦可為害蔥及蒜。
 防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
6-6式波爾多液 (Bordeaux Mixture)	400公升			
75%四氯異苯腈 可濕性粉劑 (Chlorothalonil)	2.5-3.0 公斤	400	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.施藥時應加展著劑。
75%四氯異苯腈 水分散性粒劑 (Chlorothalonil)	2.5-3.0 公斤	400	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.施藥時應加展著劑。
40%四氯異苯腈 水懸劑* (Chlorothalonil)	2.5-6.3 公升	320	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
23.7%依普同 水懸劑* (Iprodione)	1公升	1,000	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續四次。	採收前15天停止施藥。
50%依普同 可濕性粉劑* (Iprodione)	0.8-1.0 公斤	1,000	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續四至五次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「組展」5,000倍。 2.採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑