

二十九、薑軟腐病

學名：*Pythium myriotylum* Drechsler

英名：Soft rot

病徵：

最初在地際部莖葉處呈現黃褐色病斑，繼之軟腐。地上部莖葉黃化萎凋而枯死，地下部塊莖被害呈軟腐，失去食用價值。

傳播途徑：病原菌可藉病組織在土壤中殘存。可經病種薑，污染之農機具或灌溉水媒介傳播。

防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%依得利乳劑 (Etridiazole)	20公升	1,500	發病初期開始，每平方公尺灌注稀釋液3公升，每隔10天灌注一次。	<ol style="list-style-type: none"> 1.本病為土壤病害，高溫多濕時發生。 2.發病區及四周每平方公尺灌注稀釋液3公升，不發病區為節省用藥量，可以噴霧器噴灑土表，使土表均勻濕潤為止，以預防病害之傳播。 3.採收前30天停止施藥。
35%依得利 可濕性粉劑 (Etridiazole)	15公斤	2,500		<ol style="list-style-type: none"> 1.本病為土壤病害，高溫多濕時發生。 2.發病區及四周每平方公尺灌注稀釋液3公升，不發病區為節省用藥量，可以噴霧器噴灑土表，使土表均勻濕潤為止，以預防病害之傳播。 3.採收前30天停止施藥。