

二、葫蘆科作物金花蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前10天、瓜菜類及瓜果類採收前7天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前10天、瓜菜類及瓜果類採收前7天停止施藥。
20%芬化利 水基乳劑* (Fenvalerate)	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前10天、瓜菜類及瓜果類採收前7天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate)	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前10天、瓜菜類及瓜果類採收前7天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	1.1-2.7 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前10天、瓜菜類及瓜果類採收前7天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	龍鬚菜採收前4天、瓜菜類及瓜果類採收前7天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.9-2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	龍鬚菜採收前4天、瓜菜類及瓜果類採收前7天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	龍鬚菜採收前4天、瓜菜類及瓜果類採收前7天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	龍鬚菜採收前4天、瓜菜類及瓜果類採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑

