

三、葫蘆科作物薊馬類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda- Cyhalothrin)	1-2.9 公斤	700	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前9天、瓜 果類及瓜菜類採收前7天 停止施藥。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.2-0.6 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前9天、瓜 果類及瓜菜類採收前7天 停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前9天、瓜 果類及瓜菜類採收前7天 停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前9天、瓜 果類及瓜菜類採收前7天 停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前9天、瓜 果類及瓜菜類採收前7天 停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前9天、瓜 果類及瓜菜類採收前7天 停止施藥。
43%佈飛松乳劑* (Profenofos)	1.5-2.0 公升	800	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
11.7%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.09-0.3 公升	8,000	害蟲發生時施藥一次，必 要時隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5.87%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.18-0.6 公升	4,000	害蟲發生時施藥一次，必 要時隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%賜諾殺水懸劑* (Spinosad)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前6天、瓜 菜類及瓜果類採收前3 天停止施藥。 2.避免於作物開花時期使 用。 3.毒性請參考農藥標示。
11.6%賜諾殺 水懸劑* (Spinosad)	0.2-0.4 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前6天、瓜 菜類及瓜果類採收前3 天停止施藥。 2.避免於作物開花時期使 用。 3.毒性請參考農藥標示。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
80%賜諾殺 可濕性粉劑* (Spinosad)	0.03-0.06 公升	32,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前6天、瓜果類採收前3天停止施藥。 2.避免於作物開花時期使用。 3.毒性請參考農藥標示。

*延伸使用藥劑

TACTRI