

六、瓜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.4-1 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。
25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.2-0.4 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。
10%氟尼胺 水分散性粒劑* (Fonicamid)	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前3天停止施藥。 2.具嚴重眼刺激性，中度皮膚刺激性。
50%派滅淨 水分散性粒劑* (Pymetrozine)	0.2-0.3 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具中度呼吸急毒性。
25%派滅淨 可濕性粉劑* (Pymetrozine)	0.5公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑