

七、瓜類粉蝨類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.12-0.2 公斤	10,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。
0.5%可尼丁粒劑* (Clothianidin)	25-30 公斤		1.定植前3日施藥於植穴上，施藥一次。 2.每穴用藥量1公克。	限植穴使用。
16%可尼丁 水溶性粒劑* (Clothianidin)	0.4-0.6 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對水生物中等毒；對蜜蜂劇毒。
25%派滅淨 可濕性粉劑* (Pymetrozine)	0.8公斤	1,200	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，連續二至三次。	採收前6天停止施藥。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高及對水生物中等毒。
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高及對水生物中等毒。
25%布芬淨 可濕性粉劑* (Buprofezin)	1-1.7 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.胡瓜除外。 2.採收前15天停止施藥。
2.4%第滅寧 水懸劑* (Deltamethrin)	1-1.7 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.胡瓜除外。 2.採收前6天停止施藥。 3.對水生物劇毒及對蜜蜂稍具危害。
10%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.3-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.胡瓜除外。 2.採收前6天停止施藥。 3.對鳥類具中等毒性；對蜜蜂具中度到輕度毒性。
11%百利普芬乳劑* (Pyriproxyfen)	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時施藥一次。	採收前9天停止施藥。
11%百利普芬 水懸劑* (Pyriproxyfen)	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時施藥一次。	採收前9天停止施藥。
11%百利普芬 水基乳劑* (Pyriproxyfen)	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時施藥一次。	採收前9天停止施藥。
20%達特南 水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.4-0.6 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.胡瓜除外。 2.採收前6天停止施藥。 3.具呼吸中等毒；對蜜蜂劇毒。

*延伸使用藥劑

