

十六、葫蘆科瓜菜類夜蛾類、植食性瓢蟲類

夜蛾類：包括斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、番茄夜蛾、擬尺蠖等害蟲。

防治方法：

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|---------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|--|
| 18.4%剋安勃水懸劑 (Chlorantraniliprole) | 0.3-0.8 公升 | 2,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。 |
| 35%剋安勃水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole) | 0.2-0.4 公斤 | 5,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。 |
| 5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin) | 0.5-1.3 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。 3.胡瓜限開花前使用，避免於開花期使用。 |
| 5%賽滅寧水基乳劑 (Cypermethrin) | 0.5-1.3 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。 3.胡瓜限開花前使用，避免於開花期使用。 |
| 5%賽滅寧微乳劑 (Cypermethrin) | 0.5-1.3 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。 3.胡瓜限開花前使用，避免於開花期使用。 |
| 10%賽滅寧可濕性粉劑 (Cypermethrin) | 0.2-0.5 公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。 3.胡瓜限開花前使用，避免於開花期使用。 |
| 5%賽滅寧可濕性粉劑 (Cypermethrin) | 0.3-1 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。 3.胡瓜限開花前使用，避免於開花期使用。 |
| 58%乃力松乳劑* (Naled) | 0.5-1 公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前4天停止施藥。 |
| 25%二福隆可濕性粉劑* (Diflubenzuron) | 0.4-0.6 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 50%馬拉松乳劑* (Malathion) | 1.0-1.2 公升 | 500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔5至7天施藥一次。 | 1.採收前4天停止施藥。 2.瓜類幼苗對馬拉松較敏感。 3.不可與鹼性藥劑混用。 4.溫室栽培應避免使用。 |

*延伸使用藥劑