

三十四、葫蘆科瓜果類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃 水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.3-0.8 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.2-0.4 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.3-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 微乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑