

三十六、葫蘆科瓜果類薊馬類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
43%佈飛松乳劑 (Profenofos)	1.5-2.0 公升	800	薊馬發生時施藥，每隔7 天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
500g/L(50%w/v) 佈飛松乳劑 (Profenofos)	1.5-2.0 公升	800	薊馬發生時施藥，每隔7 天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.9%貝他-賽扶寧 乳劑 (Beta-cyfluthrin)	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲發生時，每隔7天施 藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具中等口服急毒性，對 蜜蜂劇毒性，對水生物 具毒性。
2.5%畢芬寧水懸劑* (Bifenthrin)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.禁止使用於河床地西瓜 之害蟲防治。 2.採收前6天停止施藥。
2.8%畢芬寧乳劑* (Bifenthrin)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.禁止使用於河床地西瓜 之害蟲防治。 2.採收前6天停止施藥。
2.5%畢芬寧水懸劑* (Bifenthrin)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.禁止使用於河床地西瓜 之害蟲防治。 2.採收前6天停止施藥。
2.8%畢芬寧乳劑* (Bifenthrin)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.禁止使用於河床地西瓜 之害蟲防治。 2.採收前6天停止施藥。
20%覆滅蟎 水溶性粉劑* (Formetanate)	2.5公斤	600	害蟲發生時施藥一次。	採收前7天停止施藥。
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開 花時使用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.3-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開 花時使用。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開 花時使用。
5%賽滅寧 微乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開 花時使用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開 花時使用。

*延伸使用藥劑

