

### 三十七、葫蘆科瓜果類南黃薊馬

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%克凡派水懸劑 (Chlorfenapyr)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時，每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對口、皮膚及呼吸具中等毒性，對鳥類及蜜蜂毒性高，對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
50%免敵克 可濕性粉劑 (Bendiocarb)	0.8公斤	1,500	於薊馬發生時即施藥，以後每隔7天施藥一次，連續施藥四次。	採收前7天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑 (Acetamiprid)	0.2-0.3 公斤	4,000	害蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次。	1.本藥劑試驗時加「組展」(展著劑)3000倍。 2.採收前6天停止施藥。
9.6%益達胺水懸劑 (Imidacloprid)	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲發生時，每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
9.6%益達胺溶液 (Imidacloprid)	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲發生時，每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%福化利乳劑 (tau-Fluvalinate)	0.4公升	3,000	於薊馬發生時即施藥，以後每隔7天施藥一次，連續施藥四次。	1.採收前7天停止施藥。 2.本藥劑試驗時加「消抗靈」增效劑2,500倍。
60%繁米蟲乳劑 (Vamidotion + MIPC + BPMC)	1.0公升	1,200	於薊馬發生時即施藥，以後每隔7天施藥一次，連續施藥四次。	1.採收前7天停止施藥。 2.本藥劑試驗時加展著劑「出來通」3,000倍。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液 (lambda- Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	發生時每隔7天噴藥一次。	採收前7天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑 (lambda- Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	發生時每隔7天噴藥一次。	採收前7天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑 (lambda- Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	發生時每隔7天噴藥一次。	採收前7天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑 (lambda- Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	發生時每隔7天噴藥一次。	採收前7天停止施藥。