

### 三十八、葫蘆科瓜果類淡色薊馬

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
48.34%丁基加保扶乳劑 (Carbosulfan)	0.6-1.2 公升	1,500	於薊馬開始發生時施藥，每週一次，連續不得超過四次。	採收前6天停止施藥。
48.34%丁基加保扶水基乳劑 (Carbosulfan)	0.6-1.2 公升	1,500	於薊馬開始發生時施藥，每週一次，連續不得超過四次。	採收前6天停止施藥。
25%丁基加保扶可濕性粉劑 (Carbosulfan)	1.5-2.0 公斤	700	發生時每隔7天噴藥一次。	採收前15天停止施藥。
2.8%第滅寧乳劑 (Deltamethrin)	0.5-0.6 公升	2,000	發生時每隔7天噴藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧水基乳劑 (Deltamethrin)	0.5-0.6 公升	2,000	發生時每隔7天噴藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.4%第滅寧水懸劑 (Deltamethrin)	0.5-0.6 公升	2,000	發生時每隔7天噴藥一次。	採收前6天停止施藥。
50%滅賜克可濕性粉劑 (Methiocarb)	1-1.7 公斤	1,000	於薊馬發生時即行施藥，每週一次，連續不得超過四次。	採收前6天停止施藥。

TAA