

### 四十三、葫蘆科瓜果類銀葉粉蝨

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
9.4%六伏隆水懸劑 (Hexaflumuron)	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生時，每隔7天開始施藥一次。	1.採收前15天停止施藥。 2.對甲殼類劇毒，禁用於水域、空中施藥或大面積施用。
16%可尼丁 水溶性粒劑 (Clothianidin)	0.4-0.6 公斤	3,000	害蟲發生時，每隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對水生物中等毒；對蜜蜂劇毒。
25%布芬淨 可濕性粉劑 (Buprofezin)	1-1.7 公斤	1,000	害蟲發生時，每隔7天開始施藥一次。	採收前15天停止施藥。
11%百利普芬乳劑 (Pyriproxyfen)	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時，每隔7天施藥一次，連續二至三次。	採收前9天停止施藥。
11%百利普芬 水基乳劑 (Pyriproxyfen)	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時，每隔7天施藥一次，連續二至三次。	採收前9天停止施藥。
11%百利普芬 水懸劑 (Pyriproxyfen)	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時，每隔7天施藥一次，連續二至三次。	採收前9天停止施藥。
2%阿巴汀乳劑 (Abamectin)	1-1.7 公升	1,000	害蟲發生時，每隔7天開始施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.對蜜蜂劇毒。
2%阿巴汀水基乳劑 (Abamectin)	1-1.7 公升	1,000	害蟲發生時，每隔7天開始施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.對蜜蜂劇毒。
25%派滅淨 可濕性粉劑 (Pymetrozine)	0.8公斤	1,200	害蟲發生時，每隔7天施藥一次，連續二至三次。	採收前6天停止施藥。
9.6%益達胺水懸劑 (Imidacloprid)	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生時，每隔7天開始施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高及對水生物中等毒。
9.6%益達胺溶液 (Imidacloprid)	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生時，每隔7天開始施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高及對水生物中等毒。
2.8%畢芬寧乳劑 (Bifenthrin)	1-1.7 公升	1,000	害蟲發生時，每隔7天開始施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生物劇毒，禁用於水域、空中施藥或大面積施用。
2.5%畢芬寧水懸劑 (Bifenthrin)	1-1.7 公升	1,000	害蟲發生時，每隔7天開始施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生物劇毒，禁用於水域、空中施藥或大面積施用。
2.4%第滅寧水懸劑 (Deltamethrin)	1-1.7 公升	1,000	害蟲發生時，每隔7天開始施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生物劇毒及對蜜蜂稍具危害。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%達特南 水溶性粒劑 (Dinotefuran)	0.4-0.6 公斤	3,000	害蟲發生時，每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具中度呼吸急毒性，對蜜蜂具劇毒性。
10%賽速安 水溶性粒劑 (Thiamethoxam)	0.3-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時，每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對鳥類具中等毒性；對蜜蜂具中度到輕度毒性。
25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.12-0.2 公斤	10,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。

\*延伸使用藥劑

TACTRI