

四十四、葫蘆科瓜果類葉蟎類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
43.2%必芬蟎水懸劑 (Bifenazate)	0.5-0.75 公升	1,500	葉蟎發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具呼吸劇毒性。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
15%亞醜蟎水懸劑* (Acequinocyl)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
100g/L氟芬隆(10%w/v) 水分散性乳劑* (Flufenoxuron)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
9.6%氟芬隆水分散性乳劑* (Flufenoxuron)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
18.3%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.25-0.67 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
15%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.3-0.8 公升	2,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
10%芬殺蟎乳劑* (Fenazaquin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
15%亞醜蟎水懸劑* (Acequinocyl)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。

*延伸使用藥劑