

八、茄科作物植食性瓢蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前14天、根莖菜類採收前35天、果菜類採收前7天停止施藥。
10%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類、果菜類採收前10天、根莖菜類採收前14天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類、果菜類採收前10天、根莖菜類採收前14天停止施藥。
20%芬化利 水基乳劑* (Fenvalerate)	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類、果菜類採收前10天、根莖菜類採收前14天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate)	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類、果菜類採收前10天、根莖菜類採收前14天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.7-2.0 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類、果菜類採收前10天、根莖菜類採收前14天停止施藥。
34%硫敵克 水懸劑* (Thiodicarb)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.2-0.6 公斤	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑