

## 九、茄科作物金花蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.3-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前4天、果菜類採收前7天、根菜類採收前6天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.6-1.9 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前4天、果菜類採收前7天、馬鈴薯採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.3-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前4天、果菜類採收前7天、馬鈴薯採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.3-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前4天、果菜類採收前7天、馬鈴薯採收前6天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前14天、根莖菜類採收前35天、果菜類採收前7天停止施藥。

\*延伸使用藥劑