

## 十二、茄科果菜類植食性瓢蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenozide)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔5天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔5天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔5天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔5天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
50%馬拉松乳劑* (Malathion)	2公升	500	害蟲發生時開始施藥，每隔5至7天施藥一次。	1.採收前4天停止施藥。 2.番茄幼苗對馬拉松較敏感。 3.不可與鹼性藥劑混用。
35%白克松 可濕性粉劑* (Pyraclofos)	0.25-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

\*延伸使用藥劑