

十三、茄科果菜類粉蝨類

茄科果菜類作物：包括番茄、甜椒、茄子、辣椒、枸杞等。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
0.5%可尼丁粒劑* (Clothianidin)	60公斤		定植後於畦上施藥一次。	對蜜蜂有劇毒性。
16%可尼丁 水溶性粒劑* (Clothianidin)	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
11%百利普芬乳劑* (Pyriproxyfen)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
11%百利普芬 水基乳劑* (Pyriproxyfen)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
11%百利普芬 水懸劑* (Pyriproxyfen)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
40.4%賽果培 水懸劑* (Thiacloprid)	0.2-0.6 公升	3,300	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.1-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥，設施栽培採收前12天停止施藥。

*延伸使用藥劑