

十六、茄科果菜類夜蛾類、毒蛾類

夜蛾類：包括斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、番茄夜蛾、擬尺蠖等害蟲。

毒蛾類：包括台灣黃毒蛾、小白紋毒蛾等害蟲。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。 3.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.3-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。 3.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。 3.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 微乳劑* (Cypermethrin)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。 3.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。 3.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
10%諾伐隆 水分散性乳劑* (Novaluron)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.此藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔5天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔5天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔5天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔5天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
50%馬拉松乳劑* (Malathion)	2公升	500	害蟲發生時開始施藥，每隔5至7天施藥一次。	1.採收前4天停止施藥。 2.番茄幼苗對馬拉松較敏感。 3.不可與鹼性藥劑混用。
35%白克松 可濕性粉劑* (Pyraclofos)	0.25-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑

TACTRI

