

十八、茄科果菜類葉蟎類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
240g/L賜滅芬水懸劑 (Spiromesifen)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟎發生初期施藥一次。	1.採收前4天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區」、「飲用水取水口一定距離內之地區」。 3.可能危害天敵。
5%芬普蟎水懸劑* (Fenpyroximate)	0.5-1.5 公升	1,000	葉蟎發生初期時，開始施藥，必要時間隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免與石灰硫磺合劑混合使用。
20%畢達本可濕性粉劑* (Pyridaben)	0.2-0.7 公斤	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。
20%畢達本水懸劑* (Pyridaben)	0.2-0.7 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。
1%密滅汀乳劑* (Milbemectin)	0.4-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天(設施栽培9天)停止施藥。
43.2%必芬蟎水懸劑* (Bifenazate)	0.5-1.0 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前3天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區」。
18.3%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.5-1.0 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
15%芬殺蟎水懸劑* (Fenazaquin)	0.3-1.0 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
10%芬殺蟎乳劑* (Fenazaquin)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑