

二十一、茄科果菜類蚜蟲類

| 藥劑名稱 | 每公頃每 次施藥量 | 稀釋倍數 (倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|--|---------------|-------------|----------------------------|------------|
| 10%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam) | 0.3-0.8 公斤 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam) | 0.1-0.3 公斤 | 5,000 | 害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl) | 0.4-1.4 公斤 | 1,500 | 蟲害發生時開始施藥，必 要時每隔7天施藥一次。 | 採收前4天停止施藥。 |
| 40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl) | 0.4-1.4 公斤 | 1,500 | 蟲害發生時開始施藥，必 要時每隔7天施藥一次。 | 採收前4天停止施藥。 |
| 40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl) | 0.4-1.4 公斤 | 1,500 | 蟲害發生時開始施藥，必 要時每隔7天施藥一次。 | 採收前4天停止施藥。 |
| 25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl) | 0.6-2.1 公斤 | 1,000 | 蟲害發生時開始施藥，必 要時每隔7天施藥一次。 | 採收前4天停止施藥。 |

*延伸使用藥劑